



Dans quels cas utiliser cet aliment:

- Perte d'appétit, bâillements, poil terne, crottins mous, défense à la jambe, réaction au sanglage, coliques récurrentes, difficultés à prendre du poids, grincements de dents...
- En période post opératoire, pendant et après un traitement médicamenteux, anti-inflammatoire ou antibiotique.




LAMBEY S.A.
MOULIN DES PRÉS
71270 TORPES

LAMBEY.COM
LAMBEY@LAMBEY.FR
TÉL. +33 (0)3 85 72 31 65



GASTRI FiBER

SENSIBILITE GASTRIQUE & DIGESTIVE



Aliment équilibré



Sans céréales entières



Sans sucres ajoutés

Lambey



GASTRI FIBER



DENSITÉ 1L = 400 G

SENSIBILITE GASTRIQUE	DISTRIBUTION QUOTIDIENNE
Sensibilité gastrique modérée	Au minimum 1 à 2 kg par jour, soit 2,5 à 5 litres par jour, en complément d'un autre aliment, à répartir sur l'ensemble des repas.
Sensibilité gastrique forte	Ration complète.

COMPOSITION

Son de blé, Luzerne déshydratée, Fibres de luzerne déstructurées, Marc de pomme séchées, Pulpes de chicorée séchée, Argiles, Huile de colza, Graines de lin cuites extrudées, Flocons de pois, Fructo-oligosaccharides, Phosphate bicalcique, Sel, Carottes séchées, Germes de blé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AU KG BRUT

Calcium	.17 g
Phosphore	.6 g
Magnésium	2,6 g
Potassium	13,6 g
Mat. azotée digestible	.83 g
Oméga 3	.12 g
Oméga 6	.16 g

ACIDES AMINÉS AU KG BRUT

Lysine	4,6 g
Méthionine + cystine	3,3 g
Méthionine	1,6 g
Thréonine	3,9 g
Tryptophane	1,4 g
Leucine	7,2 g
Arginine	5,8 g
Isoleucine	4,2 g
Valine	5,6 g
Phénylalanine	4,6 g

UTILISATION

A distribuer mouillé pour les chevaux qui vivent au pré ou qui mangent rapidement.

Les quantités distribuées sont à ajuster en fonction du poids, de l'état corporel, de l'âge, de l'activité, de la race du cheval, ainsi qu'en fonction de la nature, des quantités et de la qualité du fourrage distribué.

Nos recommandations :

- Distribuer au minimum 1.2 kg de foin pour 100 kg de poids vif pour des chevaux sur litière paille et 1.5 kg par 100 kg de poids vif pour des chevaux sur litière copeaux.
- Laisser une pierre à sel à disposition en libre-service et de l'eau propre à volonté.
- Dans l'idéal, fractionner la ration en minimum 3 repas équilibrés.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéine brute	.11,5 %
Cellulose brute	.15,2 %
Matières grasses brutes	6,5 %
Matières minérales brutes	.12,7 %
Sodium	0,44 %
Amidon	5,5 %

VITAMINES ET OLIGO ÉLÉMENTS AU KG BRUT

Vitamine A	15 000.U.I
Vitamine D3	2 500.U.I
Vitamine E	800 mg
Vitamine B1	11 mg
Vitamine B2	8 mg
Vitamine B6	8 mg
Vitamine B12	0,03 mg
Vitamine PP	21 mg
Vitamine C	800 mg
Vitamine K3	0,9 mg
Acide pantothénique	6,6 mg
Acide folique	0,5 mg
Chlorure de choline	202 mg
Biotine	6,1 mg
Fer	115 mg
Cuivre	35 mg
Zinc	141 mg
Manganèse	101 mg
Iode	1,51 mg
Cobalt	0,45 mg
Sélénium total	1,0 mg

ÉQUILIBRE LA FLORE INTESTINALE



L'apport de fructo-oligosaccharides et d'inuline stimule la flore intestinale bénéfique et réduit la flore potentiellement pathogène.



RELANCE L'APPÉTIT



Les troubles digestifs provoquent une baisse d'appétit. Les ingrédients actifs du GASTRI Fiber permettent d'améliorer l'appétit.



SOUTIEN GASTRIQUE PUISSANT

FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE LA DIGESTION

EFFICACITÉ PROUVÉE *

AMELIORATION SIGNIFICATIVE EN 5 SEMAINES



PROTÈGE LES MUQUEUSES GASTRIQUES ET INTESTINALES

Une combinaison d'ingrédients spécifiques joue un rôle de pansement digestif.



** DOPING CONTROL PROCÉDURE : fabriqué selon nos procédures qualité intégrant la gestion des risques de contamination de nos aliments par des substances naturelles prohibées par les codes des courses et des sports équestres.

13.04.2021

*Étude présentée au Congrès de la BEVA, principal congrès Européen des vétérinaires équins à Birmingham.